

DIAGNOSI infermieristiche NANDA-I 2018-2020 suddivise secondo il modello Gordon

| 1. MODELLO di PERCEZIONE e di GESTIONE DELLA SALUTE (27 diagnosi) | | | | |
|--|---|--|--|--|
| 4 | rischio di Infezione | | | |
| 35 | rischio di Lesione | | | |
| 36 | rischio di Soffocamento | | | |
| 37 | rischio di Avvelenamento | | | |
| 38 | rischio di Trauma fisico | | | |
| 43 | Protezione inefficace | | | |
| 78 | Gestione della salute inefficace | | | |
| 79 | Non adesione | | | |
| 80 | Gestione della salute della famiglia inefficace | | | |
| 87 | rischio di Lesione da posizionamento perioperatorio | | | |
| 99 | Mantenimento della salute inefficace | | | |
| 155 | rischio di Cadute | | | |
| 162 | disponibilità a migliorare la gestione della salute | | | |
| 180 | rischio di Contaminazione | | | |
| 181 | Contaminazione | | | |
| 188 | Comportamento di salute rischioso | | | |
| 206 | rischio di Sanguinamento | | | |
| 213 | rischio di Trauma vascolare | | | |
| 215 | Salute della comunità insufficiente | | | |
| 231 | Rischio di Sindrome dell'anziano fragile | | | |
| 257 | Sindrome dell'anziano fragile | | | |
| 262 | Disponibilità a migliorare l'alfabetizzazione della salute (2018) | | | |
| 266 | Rischio di infezione del sito chirurgico (2018) | | | |
| 261 | Rischio di secchezza delle fauci (2018) | | | |
| 268 | Rischio di tromboembolismo venoso (2018) | | | |
| 272 | Rischio di mutilazione genitale femminile (2018) | | | |
| 265 | Rischio di infortunio sul lavoro (2018) | | | |
| 274 | Rischio di termoregolazione inefficace (2018) | | | |
| 2. MODELLO NUTRIZIONALE e METABOLICO (47 diagnosi) | | | | |
| 2 | Nutrizione squilibrata: inferiore al fabbisogno metabolico | | | |
| 5 | rischio di Temperatura corporea squilibrata | | | |
| 6 | Ipotermia | | | |
| 7 | Ipertermia | | | |
| 8 | Termoregolazione inefficace | | | |
| 25 | rischio di Volume di liquidi squilibrato | | | |
| 26 | Volume di liquidi eccessivo | | | |
| 27 | Volume di liquidi insufficiente | | | |

DIAGNOSI infermieristiche NANDA-I 2018-2020 suddivise secondo il modello Gordon

| | | | | | |
|-----|--|--|--|--|--|
| 28 | rischio di Volume di liquidi insufficiente | | | | |
| 39 | rischio di Aspirazione | | | | |
| 41 | Reazione allergica al lattice | | | | |
| 42 | rischio di Reazione allergica al lattice | | | | |
| 44 | Integrità tissutale compromessa | | | | |
| 45 | Integrità della mucosa orale compromessa | | | | |
| 46 | Integrità cutanea compromessa | | | | |
| 47 | rischio di Integrità cutanea compromessa | | | | |
| 48 | Dentizione compromessa | | | | |
| 103 | Deglutizione compromessa | | | | |
| 104 | Allattamento al seno inefficace | | | | |
| 105 | Allattamento al seno interrotto | | | | |
| 106 | Disponibilità a migliorare l'Allattamento al seno | | | | |
| 107 | Modello di alimentazione del bambino inefficace | | | | |
| 134 | Nausea | | | | |
| 160 | disponibilità a migliorare il Bilancio idrico | | | | |
| 163 | disponibilità a migliorare la Nutrizione | | | | |
| 178 | rischio di Funzionalità epatica compromessa | | | | |
| 179 | rischio di Glicemia instabile | | | | |
| 194 | Iperbilirubinemia neonatale | | | | |
| 195 | rischio di Squilibrio elettrolitico | | | | |
| 216 | Produzione di latte materno insufficiente | | | | |
| 217 | rischio di Reazione allergica | | | | |
| 218 | rischio di Reazione avversa ai mezzi di contrasto iodati | | | | |
| 219 | rischio di Secchezza oculare | | | | |
| 220 | rischio di Lesione termica | | | | |
| 230 | rischio di iperbilirubinemia neonatale | | | | |
| 232 | Obesità | | | | |
| 233 | Sovrappeso | | | | |
| 234 | Rischio di Sovrappeso | | | | |
| 247 | Rischio di integrità della mucosa orale compromessa | | | | |
| 245 | Rischio di Lesione corneale | | | | |

DIAGNOSI infermieristiche NANDA-I 2018-2020 suddivise secondo il modello Gordon

| | | | | | |
|--|---|--|--|--|--|
| 248 | Rischio di Integrità tissutale compromessa | | | | |
| 249 | Rischio di Ulcera da pressione | | | | |
| 253 | Rischio di Ipotermia | | | | |
| 254 | Rischio di Ipotermia perioperatoria | | | | |
| 269 | Comportamenti alimentari inefficaci dell'adolescente (2018) | | | | |
| 270 | Comportamenti alimentari inefficaci nel bambino(2018) | | | | |
| 271 | Comportamenti di alimentazione inefficaci del lattante(2018) | | | | |
| 263 | Rischio di sindrome da squilibrio metabolico(2018) | | | | |
| 3. MODELLO di ELIMINAZIONE | | | | | |
| (18 diagnosi) | | | | | |
| 11 | Stipsi | | | | |
| 12 | Stipsi percepita | | | | |
| 13 | Diarrea | | | | |
| 14 | Incontinenza fecale | | | | |
| 15 | rischio di Stipsi | | | | |
| 16 | Eliminazione urinaria compromessa | | | | |
| 17 | Incontinenza urinaria da sforzo | | | | |
| 18 | Incontinenza urinaria riflessa | | | | |
| 19 | Incontinenza urinaria da urgenza | | | | |
| 20 | Incontinenza urinaria funzionale | | | | |
| 22 | rischio di Incontinenza urinaria da urgenza | | | | |
| 23 | Ritenzione urinaria | | | | |
| 466 | disponibilità a migliorare l'Eliminazione urinaria | | | | |
| 176 | Incontinenza urinaria da rigurgito | | | | |
| 196 | Motilità gastrointestinale disfunzionale | | | | |
| 197 | rischio di Motilità gastrointestinale disfunzionale | | | | |
| 235 | Stipsi funzionale cronica | | | | |
| 236 | Rischio di Stipsi funzionale cronica | | | | |
| 250 | Rischio di Lesione del tratto urinario | | | | |
| 4. MODELLO di ATTIVITA' e di ESERCIZIO FISICO | | | | | |
| (48 diagnosi) | | | | | |
| 9 | Disriflessia | | | | |
| 10 | rischio di Disriflessia | | | | |
| 29 | Gittata cardiaca ridotta | | | | |
| 30 | Scambi gassosi compromessi | | | | |
| 31 | Liberazione delle vie aeree inefficace | | | | |
| 32 | Modello di respirazione inefficace | | | | |

DIAGNOSI infermieristiche NANDA-I 2018-2020 suddivise secondo il modello Gordon

| | | | | | |
|-----|---|--|--|--|--|
| 33 | Ventilazione spontanea compromessa | | | | |
| 34 | Risposta allo svezzamento dal ventilatore disfunzionale | | | | |
| 40 | rischio di Sindrome da immobilizzazione | | | | |
| 49 | Capacità adattativa intracranica ridotta | | | | |
| 85 | Mobilità compromessa | | | | |
| 86 | rischio di Disfunzione neurovascolare periferica | | | | |
| 88 | Deambulazione compromessa | | | | |
| 89 | Mobilità compromessa con la sedia a rotelle | | | | |
| 90 | Capacità di trasferimento compromessa | | | | |
| 91 | Mobilità compromessa nel letto | | | | |
| 92 | Intolleranza all'attività | | | | |
| 93 | Fatigue | | | | |
| 94 | rischio di Intolleranza all'attività | | | | |
| 97 | Coinvolgimento in attività diversive ridotto | | | | |
| 98 | Gestione della casa compromessa | | | | |
| 100 | Guarigione chirurgica ritardata | | | | |
| 102 | deficit nella Cura di sé: alimentazione | | | | |
| 108 | deficit nella Cura di sé: bagno | | | | |
| 109 | deficit nella Cura di sé: vestirsi | | | | |
| 110 | deficit nella Cura di sé: uso del gabinetto | | | | |
| 112 | rischio di Sviluppo ritardato | | | | |
| 443 | rischio di Crescita sproporzionata | | | | |
| 115 | rischio di Comportamento disorganizzato del bambino | | | | |
| 116 | Comportamento disorganizzato del bambino | | | | |
| 117 | disponibilità a migliorare il Comportamento organizzato del bambino | | | | |
| 154 | Wandering | | | | |
| 156 | rischio di morte improvvisa infantile | | | | |
| 168 | Stile di vita sedentario | | | | |
| 182 | disponibilità a migliorare la Cura di sé | | | | |
| 193 | Autonegligenza | | | | |
| 200 | rischio di Perfusionazione tissutale cardiaca ridotta | | | | |
| 201 | rischio di Perfusionazione tissutale cerebrale inefficace | | | | |

DIAGNOSI infermieristiche NANDA-I 2018-2020 suddivise secondo il modello Gordon

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| 202 | rischio di Perfusiones gastrointestinale inefficace | | | | |
| 203 | rischio di Perfusiones renale inefficace | | | | |
| 204 | Perfusiones tissutale periferica inefficace | | | | |
| 205 | rischio di Shock | | | | |
| 228 | rischio di Perfusiones tissutale periferica inefficace | | | | |
| 237 | Posizione seduta compromessa | | | | |
| 238 | Posizione eretta compromessa | | | | |
| 239 | Rischio di Funzione cardiovascolare compromessa | | | | |
| 240 | Rischio di Gittata cardiaca ridotta | | | | |
| 246 | Rischio di Guarigione chirurgica ritardata | | | | |
| 273 | Campo di energia squilibrato (2018) | | | | |
| 267 | Rischio di pressione arteriosa instabile (2018) | | | | |
| 5. MODELLO di RIPOSO e di SONNO (4 diagnosi) | | | | | |
| 95 | Insonnia | | | | |
| 96 | rivazione di Sonno | | | | |
| 165 | disponibilità a migliorare il Sonno | | | | |
| 198 | Modello di sonno disturbato | | | | |
| 6. MODELLO COGNITIVO e PERCETTIVO (28 diagnosi) | | | | | |
| 54 | rischio di Solitudine | | | | |
| 83 | Conflitto decisionale | | | | |
| 118 | Disturbo dell'immagine corporea | | | | |
| 119 | Autostima cronicamente scarsa | | | | |
| 120 | Autostima situazionale scarsa | | | | |
| 121 | Disturbo dell'Identità personale | | | | |
| 123 | Eminegligenza | | | | |
| 124 | Mancanza di speranza | | | | |
| 125 | Senso di impotenza | | | | |
| 126 | Conoscenza insufficiente | | | | |
| 128 | Confusione mentale acuta | | | | |
| 129 | Confusione mentale cronica | | | | |
| 131 | Memoria compromessa | | | | |
| 132 | Dolore acuto | | | | |
| 133 | Dolore cronico | | | | |

DIAGNOSI infermieristiche NANDA-I 2018-2020 suddivise secondo il modello Gordon

| | | | | | |
|--|---|--|--|--|--|
| 140 | rischio di Violenza rivolta a se stessi | | | | |
| 161 | disponibilità a migliorare la Conoscenza | | | | |
| 173 | rischio di Confusione mentale acuta | | | | |
| 183 | disponibilità a migliorare il Benessere | | | | |
| 184 | disponibilità a migliorare il Processo decisionale (decision making) | | | | |
| 199 | Pianificazione delle attività inefficace | | | | |
| 214 | Benessere compromesso | | | | |
| 226 | rischio di Pianificazione delle attività inefficace | | | | |
| 242 | Processo decisionale autonomo (decision making) compromesso | | | | |
| 243 | Disponibilità a migliorare il Processo decisionale autonomo (decision making) | | | | |
| 244 | Rischio di Processo decisionale autonomo (decision makin) compromesso | | | | |
| 255 | Sindrome del dolore cronico | | | | |
| 256 | Dolore da arto | | | | |
| 7. MODELLO di PERCEZIONE DI SÉ e di CONCETTO DI SE' (12 diagnosi) | | | | | |
| 146 | Ansia | | | | |
| 147 | Ansia di morte | | | | |
| 148 | Paura | | | | |
| 152 | rischio di Senso di impotenza | | | | |
| 153 | rischio di Autostima situazionale scarsa | | | | |
| 167 | disponibilità a migliorare il Concetto di sé | | | | |
| 174 | rischio di Dignità umana compromessa | | | | |
| 185 | disponibilità ad aumentare la Speranza | | | | |
| 187 | disponibilità a sviluppare il proprio Potenziale | | | | |
| 224 | Rischio di Autostima cronicamente scarsa | | | | |
| 225 | rischio di disturbo dell'identità personale | | | | |
| 251 | Controllo emozionale labile | | | | |
| 8. MODELLO di RUOLI e di RELAZIONI (26 diagnosi) | | | | | |
| 51 | Comunicazione verbale compromessa | | | | |
| 52 | Interazioni sociali compromesse | | | | |

DIAGNOSI infermieristiche NANDA-I 2018-2020 suddivise secondo il modello Gordon

| | | | | | |
|---|---|--|--|--|--|
| 53 | Isolamento sociale | | | | |
| 55 | Prestazioni di ruolo inefficaci | | | | |
| 56 | Ruolo genitoriale compromesso | | | | |
| 57 | rischio di Ruolo genitoriale compromesso | | | | |
| 58 | rischio di Attaccamento compromesso | | | | |
| 60 | Processi familiari interrotti | | | | |
| 61 | Tensione nel ruolo di caregiver | | | | |
| 62 | rischio di Tensione nel ruolo di caregiver | | | | |
| 63 | Processi familiari disfunzionali | | | | |
| 64 | Conflitto in rapporto al ruolo genitoriale | | | | |
| 114 | Sindrome da stress da trasferimento | | | | |
| 135 | Lutto complicato | | | | |
| 136 | Lutto | | | | |
| 137 | Afflizione cronica | | | | |
| 138 | rischio di Violenza rivolta ad altri | | | | |
| 149 | rischio di Sindrome da stress da trasloco | | | | |
| 157 | disponibilità a migliorare la Comunicazione | | | | |
| 159 | disponibilità a migliorare i Processi familiari | | | | |
| 164 | disponibilità a migliorare il Ruolo genitoriale | | | | |
| 172 | rischio di Lutto complicato | | | | |
| 207 | disponibilità a migliorare la Relazione | | | | |
| 222 | Controllo de li impulsi inefficace | | | | |
| 223 | Relazione inefficace | | | | |
| 229 | rischio di Relazione inefficace | | | | |
| 9. MODELLO di SESSUALITA' e di RIPRODUZIONE (7 diagnosi) | | | | | |
| 59 | Disfunzione sessuale | | | | |
| 65 | Modello di sessualità inefficace | | | | |
| 142 | Sindrome da trauma da stupro | | | | |
| 208 | disponibilità a migliorare il Processo della gravidanza e della maternità | | | | |
| 209 | rischio di disturbo della Diade madre-feto | | | | |
| 221 | Processo della gravidanza e della maternità Inefficace | | | | |

DIAGNOSI infermieristiche NANDA-I 2018-2020 suddivise secondo il modello Gordon

| | | | | | |
|--|---|--|--|--|--|
| 227 | rischio di Processo della gravidanza e della maternità inefficace | | | | |
| 10. MODELLO di COPING e di TOLLERANZA ALLO STRESS (23 diagnosi) | | | | | |
| 69 | Coping inefficace | | | | |
| 71 | Coping difensivo | | | | |
| 72 | Negazione inefficace | | | | |
| 73 | Coping inadeguato della famiglia | | | | |
| 74 | Coping compromesso della famiglia | | | | |
| 75 | disponibilità a migliorare il Coping della famiglia | | | | |
| 76 | disponibilità a migliorare il Coping della comunità | | | | |
| 77 | Coping inefficace della comunità | | | | |
| 139 | rischio di Automutilazione | | | | |
| 141 | Sindrome post-traumatica | | | | |
| 145 | rischio di Sindrome post-traumatica | | | | |
| 150 | rischio di Suicidio | | | | |
| 151 | Automutilazione | | | | |
| 158 | disponibilità a migliorare il Coping | | | | |
| 177 | sovraccarico psicofisico da Stress | | | | |
| 210 | Resilienza compromessa | | | | |
| 211 | rischio di Resilienza compromessa | | | | |
| 212 | disponibilità a migliorare la Resilienza | | | | |
| 241 | Regolazione dell'umore compromessa | | | | |
| 260 | Rischio di processo migratorio complicato (2018) | | | | |
| 264 | Sindrome da astinenza neonatale(2018) | | | | |
| 258 | Sindrome da astinenza acuta da sostanze(2018) | | | | |
| 259 | Rischio di Sindrome da astinenza acuta da sostanze(2018) | | | | |
| 11. MODELLO di VALORI e di CONVINZIONI (7 diagnosi) | | | | | |
| 66 | Sofferenza spirituale | | | | |
| 67 | rischio di Sofferenza spirituale | | | | |
| 68 | disponibilità a migliorare il Benessere spirituale | | | | |
| 169 | Religiosità compromessa | | | | |
| 170 | rischio di Religiosità compromessa | | | | |
| 171 | disponibilità a migliorare la Religiosità | | | | |
| 175 | Sofferenza morale | | | | |